

Pharmacocinétique de population

2024-2025

Introduction

- Objectifs thérapeutiques → STP ?
 - maximum efficacité du traitement
 - minimum de toxicité
- Problème: variabilité PK des médicaments
- Solution: individualiser les posologies



paramètres PK individuels



Pharmacocinétique de population

- Définir les paramètres de la population
 - Paramètres PK moyens
 - Variabilité interindividuelle des paramètres PK
 - Variabilité résiduelle (écarts au modèle...)
 - Facteurs influençant paramètres PK
- Définir les paramètres PK individuels

Paramètres de la population + mesure(s) de la concentration plasmatique/sanguine du médicament chez le patient traité

⇓

Paramètres PK individuels, calcul des AUC

⇓

Adaptation de la posologie

1) **Estimation des paramètres de la population**

2-1) définition de la population

2-2) méthodes


2) **Evaluation des paramètres PK individuels**

3) **Conclusion**

1) Estimation des paramètres de la population

1-1) Définition de la population

- **Patients** traités par le médicament étudié
≠ études PK classiques
 - Quelque soit le protocole thérapeutique
≠ études PK classiques
 - Prélèvements :
 - 1 à n prélèvements par patients
 - Δt différents
 - paramètres physiologiques individuels (poids, Cl créat...) au moment du prélèvement
 - >> 30 sujets
- ⇒ exclusion des sujets ↓ (éthique: enfants)



Intérêt du suivi thérapeutique des concentrations plasmatiques de ceftriaxone administrée à posologie élevée dans le traitement des infections neuro-méningées, en cours

N = 171 prélèvements , 67 patients , 1 à 4 prélèvements / patient

1 X / jour ou 2 X / jour

4 g à 12 g / 24 H


Objectif : 200 patients sur 2 ans → multicentrique (Nantes, Rennes, Tours , Saint Nazaire, La Roche sur Yon, Poitiers, Angers)

2-2) Méthodes

2-2-1 : Méthode du pool de données

Principe:

- Grouper toutes mesures de tous les patients
- Analyser ce pool comme 1 sujet



☺:

- simple
- peu de données par sujet

☹:

- ne différencie pas la variabilité interindividuelle



possible si peu de variabilité interindividuelle



très rare

2-2-2 Méthodes à effets mélangés : + + + +

- peu de données par sujet
- Beaucoup de sujets


- *Méthode paramétrique:*

NONMEM (= non linear mixed effect model)

⇒ Référence

- *Méthodes non paramétriques*

Pmetrics...



Principe - NONMEM

« non linear mixed effect model »



modélisation des effets mixtes : effets
« fixes » et effets « aléatoires »



2 catégories de paramètres estimés

- Paramètres des effets «fixes » (« fixed model »):

= paramètres du modèle pharmacocinétique

Ex : IV, 1 compartiment : **Vd, Cl**

$$C(t) = D/Vd \times e^{-Cl/Vd \times t}$$

+ relations entre paramètres pharmacocinétiques
et covariables (poids, âge...)

Ex : $Vd = \theta_1 \times \text{poids} + \theta_2 \dots$

$\Rightarrow$ Ex : estimations de **Vd, Cl, θ_1 θ_2**

- Paramètres des effets «aléatoires» («random model»):

→ Décrit les variabilités :

- *Variabilité interindividuelle des paramètres PK*

$$Ex : Vd_i = Vd_{pop} + \eta$$

η = « eta » = erreur liée à la variabilité interindividuelle

- *Variabilité résiduelle portant sur $C(t)$*

$$C(t)_{\text{observée}} = C(t)_{\text{prédite}} + \varepsilon$$

ε = « epsilon » = erreur résiduelle liée aux erreurs de mesure, écart au modèle

$\Rightarrow$ estimations de η , ε

- Estimation des paramètres «fixes » et « aléatoires »:

= minimisation de la **fonction objective**

La fonction objective est une fonction explicite de tous les paramètres incluant:

- paramètres « fixes »: $\mathbf{Vd}, \mathbf{Cl}, \theta_1 \theta_2 \dots$
- paramètres « aléatoires » : η, ε



Estimation paramètres

Comment - NONMEM

- 1) Saisir le pool de données [t , $C(t)$, covariables] pour chaque individu
- 2) Choix du modèle PK (po, IV, 1 cpt, 2 cpt...)
- 3) Choix du modèle d'erreur

- Modèle d'erreur homoscédastique

$$Vd_i = Vd_{pop} + \eta$$

$$C(t)_{\text{observée}} = C(t)_{\text{prédite}} + \varepsilon$$

- Modèle d'erreur proportionnelle

$$Vd_i = Vd_{pop} \times (1 + \eta)$$

$$C(t)_{\text{observée}} = C(t)_{\text{prédite}} \times (1 + \varepsilon)$$

...

4) Estimation du **modèle de base** sans prise en compte des covariables



Meilleur modèle = amélioration de l'adéquation entre C observée et C prédite



Adéquation évaluée par :

- ↓ Fonction objective :
↓ 4 points : significatif ($p < 0.05$ - test Chi 2)

- ↓ variabilité résiduelle

- ↓ biais – précision:

$$\text{Biais} = 1/n \sum (\text{Cobs} - \text{Cpred})$$

$$\text{Précision} = (1/n \sum (\text{Cobs} - \text{Cpred})^2)^{1/2}$$

- Éléments graphiques:

$$(\text{Cobs} - \text{Cpred}) / \text{Cpred} = f(\text{Cpred})$$

$$\text{Cpred} = f(\text{Cobs})$$

5) Test de l'effet des covariables sur chaque paramètre PK : amélioration du modèle de base avec 1 covariable dans le modèle de base ?

$$\text{Ex : Cl} = \theta_1 \times \text{Cl créat} + \theta_2 \Rightarrow p < 0.05$$

$$\text{Ex : Cl} = \theta_1 / \text{âge} + \theta_2 \Rightarrow p < 0.05$$

6) Modèle « intermédiaire » avec toutes les covariables « significatives »

$$\text{Ex : Cl} = (\theta_1 \times \text{Cl créat}) + (\theta_2 / \text{âge}) + \theta_3$$

7) Retrait des covariables 1 par 1 du modèle intermédiaire:

âge et Cl créat = même type d'information
(corrélation âge et Cl Créat vérifiée dans notre population)

Ex: retrait âge, on garde Cl créat

⇒ ↑ fonction objective de 1 point

Ex: retrait Cl créat, on garde âge

⇒ ↑ fonction objective de 11 points



covariable gardée dans le modèle = Cl créat
(plus « significative »)

8) Modèle final :

Garder covariables avec signification clinique

$$\text{Ex: Cl (L/h)} = 60/\hat{\text{age}}(an) + 10^{-9} (\text{sexe: 0 ou 1}) + 5$$

⇒ Sexe : pas de signification clinique

⇒ Âge : signification clinique

9) Validation du modèle final :

- Validation externe (2^{ème} base de données)
- Simulations (Visual Predictive Check)




Fig. 3. Plot of visual predictive checks [DV, observed concentration (mg/L); TIME, time after start of infusion (h)] obtained by simulations using the final model of total ertapenem pharmacokinetic (median and 95% confidence interval).

- bootstrap

TABLE 1. PARAMETER ESTIMATES OF DARUNAVIR PHARMACOKINETICS

	<i>Basic model</i>		<i>Final model</i>		
	<i>Estimates</i>	<i>Standard error of estimates</i>	<i>NONMEM</i>		<i>BOOTSTRAP</i>
			<i>Estimates</i>	<i>Standard error of estimates</i>	
Objective function	265.7		230.2		
Parameters					
Cl/F (liter/h) ^a					
THETA1	12.1	3.50	10.7	2.21	10.9
THETA2			7.12	0.95	7.4
THETA3			25.2	3.45	24.7
Vd/F (liters)	225	35.12	198	25.43	191.5
Ka (/h)	1.34	0.45	0.95	0.35	1.28


^aCl/F= THETA1+ THETA2×[nevirapine coadministration (0 or 1)]+ THETA3×[efavirenz coadministration (0 or 1)].

ARHR,29, 2013

Exemple 1

- Recherche Covariables susceptibles de faire varier la PK de la ceftazidime chez les brûlés : élimination f (% surface brûlée) ?
- Covariables : poids, âge, sexe, Cl créat, % surface brûlée/surface totale


Modèle de base



Fonction Objective = 694

Modèle final

Cl ceftazidime = $f(1/\text{créatinémie})$




Fonction Objective = 647

British J of Clinical Pharmacology, 2003, 56, 629-634


Exemple 2

- PK ceftriaxone méningite ,
recommandations pour la posologie en
fonction DFG à partir de simulations
- Relation Cl ceftriaxone = f (DFG)
- Simulation en fonction DFG (VPC)
 - médiane DFG = 30 ml/min
 - médiane DFG = 120 ml/min
 - médiane DFG= 180 min/min

100 mg/kg/24 h 1 fois par jour



Médiane DFG = 30 mln /min



Médiane DFG = 120 mln /min

2) Evaluation des paramètres PK individuels

Méthode Bayésienne

Paramètres PK pop+ résultat Concentration mesurée



Critère Bayésien



Paramètres PK individuels




simulation




Calcul de Dose pour atteindre la cible de concentration (ou d' AUC) désirée

Théorème de Bayes

- *Hypothèse*: Distribution des paramètres PK suit **une loi normale**
- Les valeurs du couple (Cl, Vd) pour un sujet sont les valeurs dont la probabilité est maximale



Cl moyenne



Vd moyen

Les valeurs les plus probables = les plus proches des valeurs moyennes

Critère Bayésien

$\theta = A + B \Rightarrow$ minimiser

$$A = \sum (P_k - \mu_k)^2 / \sigma_k^2$$

$(\mu_k, \sigma_k) =$ (moyenne, écart type) paramètre PK dans la population

$P_k =$ valeur du paramètre individuel à estimer

$$B = \sum (C_{obs} - C_{pred})^2 / \sigma^2_{\varepsilon}$$

$C_{obs} =$ concentration(s) mesurée(s)

$C_{pred} =$ concentration(s) prédite(s)

$\sigma^2_{\varepsilon} =$ variance résiduelle

On donne à un sujet $D = 100\text{mg/j}$, $C_{\text{obs}} = 12\text{ mg/l}$, 24 h après l'injection par voie IV

	Vd	Cl	Cpred	θ
Valeur pop	200	10		
Vd	190	10	11.1	0.87
	180	10	12.5	0.50
	170	10	14.3	5.85
Cl	180	9	11.25	0.87
	180	9.5	11.9	0.28
	180	9.6	12.0	0.26

$$\theta = (Vd - 200)^2 / 40^2 + (Cl - 10)^2 / 4^2 + (C_{\text{obs}} - C_{\text{pred}})^2 / 1^2$$

avec $C_{\text{pred}} = D / Vd \times e^{-Cl / Vd \times t}$



$\Rightarrow \theta = 0.26 \Rightarrow$ paramètres PK individuels par méthode bayésienne

$Vd = 180\text{ L}$ et $Cl = 9.6\text{ L/h}$



Limites

- Multimodale
- Gauss (✕ = valeurs réelles de Cl et Vd)

Sujet 1 : estimation OK



Sujet 2 : estimation ???



Exemple 1 (MPA)

- LUC. H. , 59 ans
- Greffe rénale (01/06/2004)
- prograf + cellcept + cortancyl
- cellcept : 500 mg x 2
- Contrôle adaptation de posologie

Données du dosage

Dose avant cinétique le matin	500 mg	Nombre de prises par jour	2
Dose le midi	0 mg	Dose le soir	500 mg
Temps de prélèvement n°1 en min	20	Concentration n°1 (mg/l)	10.21
Temps de prélèvement n°2 en min	60	Concentration n°2 (mg/l)	5.02
Temps de prélèvement n°3 en min	180	Concentration n°3 (mg/l)	1.85
Temps de prélèvement n°4 en min	0	Concentration n°4 (mg/l)	1.11

ialité) - 15/01/2009

Délai entre greffe et dosage
 Taux résiduel estimé par méthode Bayésienne
 C max estimée par méthode Bayésienne

 AUC (0-12h) estimée par méthode Bayésienne
 Posologie estimée pour une AUC de 45 h.mg/L

 Posologie actuelle (par prise)
 Posologie estimée pour une AUC de 30 h.mg/L
 Posologie estimée pour une AUC de 60 h.mg/L
 Nombre de prises par jour

 AUC estimée par régression multilinéaire

1687 jours
 1,75 mg/L
 11,25 mg/L

27,77 h.mg/L
 750 mg


500 mg
 500 mg
 1000 mg
 2

26,56 h.mg/L

OK

500 x 2 : baisse poso mais toujours zone thérapeutique

Avantage par rapport à la méthode trapèze: Uniquement 3
 prélèvements (20 min, 60min, 180 min) pour calculer une aire sur 12
 heures



T0 non inclus dans le calcul : OK

tracé : OK

Exemple 2 (MPA)

- Le H. P. , 51 ans
- Greffe rénale (28/07/2004)
- prograf + cellcept + cortancyl
- cellcept : 500 mg x 2

Données du dosage

Dose avant clinique le matin	500 mg	Nombre de prises par jour	2
Dose le midi	0 mg	Dose le soir	500 mg
Temps de prélèvement n°1 en min	20	Concentration n°1 (mg/l)	2.1
Temps de prélèvement n°2 en min	60	Concentration n°2 (mg/l)	3.4
Temps de prélèvement n°3 en min	180	Concentration n°3 (mg/l)	4

Délai entre greffe et dosage
Taux résiduel estimé par méthode Bayésienne
C max estimée par méthode Bayésienne

AUC (0-12h) estimée par méthode Bayésienne
Posologie estimée pour une AUC de 45 h.mg/L

Posologie actuelle (par prise)
Posologie estimée pour une AUC de 30 h.mg/L
Posologie estimée pour une AUC de 60 h.mg/L
Nombre de prises par jour

AUC estimée par régression multilinéaire
Plus de 20% d'écart entre les 2 estimations d'AUC.
Adaptation prudente de la dose

1000 mg
0,92 mg/l
5,64 mg/L

20,8 h.mg/L
1000 mg

500 mg
750 mg
1500 mg
2

34,56 h.mg/L


T0 mesurée = 2.2 mg/L

Modèles mis au point avec la participation de : Dr B. Royer; CHU de Besançon

Commentaires de l'interpréteur:

L'AUC calculée chez ce patient est faible. Au mieux, une AUC de contrôle devra être pratiquée avant tout changement. Dans le cas contraire, l'efficacité d'une augmentation de la dose devra être contrôlée rapidement par une AUC de contrôle.

Révisé sous réserve la concentration résiduelle estimée par le modèle est égale à 0,92 mg/l
versus la concentration résiduelle mesurée = 2,2 mg/l.



T0 non inclus dans le calcul : OK, tracé OK

AUC bayes = 20.8 sous estimée – augmentation posologie ?

Intérêts Pk pop

- Nombre limité de prélèvements
 - PK enfants , vieillards
 - Etude dans population cible (paramètres PK , influence des covariables)

phase II, phase III

- Relations entre PK et caractéristiques individuelles permet d'individualiser la posologie : STP

Difficultés

- Nombre importants de patients (multicentrique, gestion des prélèvements...)
- Horaire exacte des prélèvements
- Limites méthode bayésienne (distribution normale)
- Traitement des données laborieux...