INTRODUCTION À L'ANALYSE MULTIPLE ET L'ANALYSE DE SURVIE

MRCE

20/03 et 10/04/2025

Léa Duchesne

Quel modèle pour quelle question ?

« Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles »

George Box

- Ce que l'on va voir dans ce cours : **modèles de régression**
- **Modélisation mathématique** du phénomène étudié à partir des données d'un échantillon
 - Variable **dépendante** (Y) – « à expliquer »
 - Quantitative ou qualitative
 - Variables **indépendantes** (X1, X2, ..., Xn) – « explicatives »
 - Exposition principale
 - Autres facteurs de risque (potentiels facteurs de confusion)
 - Quantitatives ou qualitatives

$$Y = f(X)$$

Quel modèle pour quelle question ?

Quelle fonction (mathématique) choisir ?

Cela dépend de :

→ La nature de la variable à expliquer

→ Conditions de validité des modèles

Quel modèle pour quelle question ?

Y, type de variable

Modèle à utiliser

Ce que l'on estime

Quantitative

Régression linéaire

Espérance (= moyenne) de Y sachant $X_1, X_2, \dots, X_n$

Qualitative binaire

Régression logistique

Risque de survenue de Y sachant $X_1, X_2, \dots, X_n$ dans une période fixée

Qualitative binaire +
notion de délai

Analyse de survie

Incidence instantanée de Y sachant $X_1, X_2, \dots, X_n$

RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE

Principe

Quantitative
↑
Variable dépendante (Y)

Quantitative ou qualitative
↑
Variable indépendante (X)

Exemple : étude du lien entre la pression systolique et la consommation de café à partir des données d'un échantillon de personnes issues de la population générale.

Id	Pression systolique	Nombre de tasses de café par jour
1	2,2	1,4
2	6,0	1,7
...	...	...

Principe

Quelle fonction ?

→ Fonction affine

$$y = \alpha + \beta \cdot x$$

Pour un individu i , la valeur de Y est égale à :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

Ordonnée à l'origine (intercept)

Pente (slope)

Erreurs

Estimation des paramètres

Quelles valeurs de β_0 et de β_1 ?

→ Droite qui « représente le mieux les données »

Estimation des paramètres

Quelles valeurs de β_0 et de β_1 ?

→ Droite qui « représente le mieux les données »

Estimation des paramètres

Quelles valeurs de β_0 et de β_1 ?

- Droite qui représente le mieux les données
- Droite qui minimise les **résidus** (ε) : méthode des **moindres carrés** (Ordinary Least Squares)

- Somme des carrés des écarts (SCE)

$$\text{SCE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \underbrace{b_0 - b_i \cdot x_i})^2$$

- Pour chaque droite $y = \alpha + \beta \cdot x$ possible, c.à.d. pour chaque couple de valeurs (α, β)
 - SCE différente
 - On choisit la droite qui minimise la SCE

Interprétation : β_0

β_0 : moyenne de Y chez les personnes pour qui $X_1 = 0$

→ Attention : pas de sens pour certaines variables, dans ce cas ne pas l'interpréter !

Exemple : si $X = \hat{\text{âge}}$

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	2,61	2×10^{-9}
Consommation de café	0,87	7×10^{-7}

En moyenne, la pression systolique des personnes ne consommant pas de café est de 2,61

Interprétation : β_1

Interprétation de β_1 dépend de la nature de la variable

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	2,61	2×10^{-9}
Consommation de café	0,87	7×10^{-7}

Cas n°1

Ici X_1 : quantitative

→ β_1 = évolution moyenne de Y lorsque X_1 augmente d'une unité

- $\beta_1 > 0$: si X_1 augmente, Y augmente
- $\beta_1 < 0$: si X_1 augmente, Y baisse

Pour une tasse de café supplémentaire, la pression systolique augmente en moyenne de 0,87

Interprétation : β_1

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	2,61	2×10^{-9}
Consommation de café (oui/non)	0,87	7×10^{-7}

Les personnes consommant du café ont une pression systolique plus élevée de 0,87 en moyenne que les personnes ne buvant pas de café

Inclure une variable qualitative catégorielle nécessite de réaliser un **modèle de régression linéaire multiple**

Si X_1 : qualitative binaire

→ β_1 = écart entre la moyenne de Y chez les personnes chez qui $X_1 = 1$ et celles chez qui $X_1 = 0$

Problème : codage peu précis

→ Boire du café augmente de β_1 unités le risque, quelque soit la dose de café consommée

On pourrait aussi inclure cette variable sous forme **catégorielle**, par exemple :

- 0 tasses
- Entre 1 et 5 tasses par jour
- > 5 tasses par jour

Modalité (« catégorie », « classe ») de référence : bien la repérer pour interpréter les résultats !

Cas n°2

Cas n°3

Existe-t-il un lien linéaire entre Y et X ?

Test sur le coefficient β_1

→ β_1 : différent de 0 ?

Lien linéaire (positif ou négatif)

Pente > 0

Pente < 0

Absence de lien

Pente = 0

Existe-t-il un lien linéaire entre Y et X ?

- Hypothèses du test :

$$H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \beta \neq 0$$

- **p-valeur** associée au coefficient < **risque 1^{ère} espèce** fixé (souvent 5%)
 - Au risque α , la variable X est liée linéairement à Y
- **p-valeur** associée au coefficient > **risque 1^{ère} espèce** fixé
 - Les données (et donc le modèle obtenu) ne permettent pas de montrer que la variable X est liée linéairement à Y

RÉGRESSION LINÉAIRE MULTIPLE

Principe

Souvent 1 seule variable explicative ne suffit pas

→ Autre variable explicative ? (tabagisme par exemple)

On souhaite expliquer Y
en fonction de X_1 et X_2

Régression linéaire
multiple

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2$$

Café

Tabac

Pour un individu i : $y_i = \alpha + \beta_1 \cdot x_{1i} + \beta_2 \cdot x_{2i} + \varepsilon_i$

Estimation des paramètres

Estimation des paramètres

Souvent 1 seule variable explicative ne suffit pas

→ Autre variable explicative ? (tabagisme par exemple)

Résumé

The diagram illustrates the components of a linear regression equation. The equation is $Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_n X_{ni} + \varepsilon_i$. The dependent variable Y_i is circled in red and labeled "Variable dépendante". The independent variables X_{1i} and X_{ni} are circled in red and labeled "Variable indépendante". The regression coefficients α , β_1 , and β_n are circled in blue and labeled "Coefficients de régression". The residual ε_i is circled in blue and labeled "Résidus".

Variable dépendante

Variable indépendante

Coefficients de régression

Résidus

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_n X_{ni} + \varepsilon_i$$

Interprétation des coefficients

β_0	Moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 0, X_2 = 0$, etc.
β_1	
$X_1 =$ quantitative	Evolution moyenne de Y lorsque X_1 augmente d'une unité, toutes les autres variables étant égales par ailleurs
$X_1 =$ qualitative binaire	Ecart entre moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 1$ et celles $X_1 = 0$, toutes les autres variables étant égales par ailleurs

Cas n°1

Cas n°2

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	1,30	1×10^{-5}
Consommation de café	0,94	5×10^{-13}
Statut tabagique	2,14	7×10^{-13}

En moyenne, la pression systolique des personnes ne consommant pas de café et ne fumant pas de tabac est de 1,30

Interprétation des coefficients

β_0	Moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 0, X_2 = 0$, etc.
β_1	
$X_1 =$ quantitative	Evolution moyenne de Y lorsque X_1 augmente d'une unité, toutes les autres variables étant égales par ailleurs
$X_1 =$ qualitative binaire	Ecart entre moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 1$ et celles $X_1 = 0$, toutes les autres variables étant égales par ailleurs

Cas n°1

Cas n°2

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	1,30	1×10^{-5}
Consommation de café	0,94	5×10^{-13}
Statut tabagique	2,14	7×10^{-13}

A statut tabagique égal, les personnes consommant $a+1$ tasses de café par jour ont une pression systolique supérieure de 0,94 en moyenne que les personnes en consommant a tasse.

Interprétation des coefficients

β_0	Moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 0, X_2 = 0$, etc.
β_1	
$X_1 =$ quantitative	Evolution moyenne de Y lorsque X_1 augmente d'une unité, toutes les autres variables étant égales par ailleurs
$X_1 =$ qualitative binaire	Ecart entre moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 1$ et celles $X_1 = 0$, toutes les autres variables étant égales par ailleurs

Cas n°1

Cas n°2

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	1,30	1×10^{-5}
Consommation de café	0,94	5×10^{-13}
Statut tabagique	2,14	7×10^{-13}

A nombre de tasse de café consommées égal, les personnes qui fument ont une pression systolique plus élevée que les personnes ne fumant pas de 2,14 en moyenne

Interprétation des coefficients

Si X : variable qualitative catégorielle (> 2 catégories)

→ Besoin d'être recodée pour être incluse dans le modèle

Pour une variable à k modalités → création de k variables binaires dites variables indicatrices (*dummy variables*)

Choix d'une modalité de référence

X_2 à 3 modalités :

- Non fumeur
- Fumeur occasionnel
- Fumeur journalier

X_2 et X_3 à 2 modalités :

- X_1 : fumeur occasionnel ($X_1 = 1$ si oui, = 0 si non fumeur)
- X_2 : fumeur journalier ($X_2 = 1$ si oui, = 0 si non fumeur)

→ β_1 : écart entre moyenne de Y chez les personnes $X=1$ et celles $X=0$

→ β_2 : écart entre moyenne de Y chez les personnes $X=2$ et celles $X=0$

Cas n°3

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	1,30	1×10^{-5}
Consommation de café	0,94	5×10^{-13}
Statut tabagique		
Fumeur occasionnel	1,43	7×10^{-12}
Fumeur journalier	2,30	6×10^{-12}

Régression multiple : pourquoi ?

- Evaluer l'effet propre de chaque variable indépendante
- Prendre en compte des facteurs de confusion

Principe

Exemple : étude du lien entre la pression systolique et la consommation de café à partir des données d'un échantillon de personnes issues de la population générale.

Id	Pression systolique	Nombre de tasses de café par jour	Tabac
1	2,2	1,1	Non fumeur
2	4,0	2,2	Fumeur
...	...	...	...

Principe

Exemple : étude du lien entre la pression systolique et la consommation de café à partir des données d'un échantillon de personnes issues de la population générale.

Id	Pression systolique	Nombre de tasses de café par jour	Tabac
1	2,2	1,1	Non fumeur
2	4,0	2,2	Fumeur
...	...	...

Régression multiple : pourquoi ?

Régression linéaire simple

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	0,68	0,019
Consommation de café	0,58	1×10^{-5}

Régression linéaire multiple

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	0,95	0,0004
Consommation de café	0,009	0,95
Statut tabagique	1,77	5×10^{-5}

Régression multiple : pourquoi ?

Régression linéaire simple

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	2,61	2×10^{-9}
Consommation de café	0,87	7×10^{-7}

Régression linéaire multiple

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	1,30	1×10^{-5}
Consommation de café	0,94	5×10^{-13}
Statut tabagique	2,14	7×10^{-13}

Interprétation des coefficients

Régression multiple

- β_0 : moyenne de Y chez les personnes $X_1 = 0, X_2 = 0$, etc.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2$$

- Chaque β représente l'effet propre de chaque variable ajusté sur le niveau des autres variables

X = quantitative

β : évolution moyenne de Y lorsque X augmente d'une unité, toutes les autres variables étant égales par ailleurs

X = qualitative binaire

β : écart entre moyenne de Y chez les personnes $X=1$ et celles $X=0$, toutes les autres variables étant égales par ailleurs

Test sur les coefficients

- Hypothèses du test :

$$H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \beta \neq 0$$

- **p-valeur** associée à un coefficient < **risque 1^{ère} espèce** fixé (souvent 5%)

→ Au risque α , la variable X est liée linéairement à Y (après ajustement sur les autres variables explicatives)

- **p-valeur** associée à un coefficient > **risque 1^{ère} espèce** fixé

→ Les données (et donc le modèle obtenu) ne permettent pas de montrer que la variable X est liée linéairement à Y (après ajustement sur les autres variables explicatives)

Exercice : analyse du lien entre l'hémoglobinémie (en g/dL) et l'âge, le sexe et la présence de drépanocytose

Variable	Coefficient
Intercept	12,9
Age (en années)	0,02
Sexe (H/F)	0,55
Drépanocytose (oui/non)	-4,14

- Ecriture du modèle ?

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3$$

$$\text{HEMOGLOBINE} = 12,9 - 0,02 \times \text{AGE} + 0,55 \times \text{SEXE} - 4,14 \times \text{DREPANOCYTOSE}$$

- Interprétation ?

Exercice : analyse du lien entre l'hémoglobinémie (en g/dL) et l'âge, le sexe et la présence de drépanocytose

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	12,9	< 0,0001
Age (en années)	0,02	0,41
Sexe (H/F)	0,55	0,30
Drépanocytose (oui/non)	-4,14	< 0,0001

- Ecriture du modèle ?

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3$$
$$\text{HEMOGLOBINE} = 12,9 - 0,02 \times \text{AGE} + 0,55 \times \text{SEXE} - 4,14 \times \text{DREPANOCYTOSE}$$

- Interprétation ?
 - Pour une année supplémentaire d'âge du patient, l'hémoglobinémie augmente en moyenne de 0,02 g/ dL .
 - Mais l'âge n'est pas significativement associé à l'hémoglobinémie ($p = 0,41 > 0,05$), après ajustement sur le sexe et la présence de drépanocytose.

Exercice : analyse du lien entre l'hémoglobinémie (en g/dL) et l'âge, le sexe et la présence de drépanocytose

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	12,9	< 0,0001
Age (en années)	0,02	0,41
Sexe (H/F)	0,55	0,30
Drépanocytose (oui/non)	-4,14	< 0,0001

- Ecriture du modèle ?

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3$$
$$\text{HEMOGLOBINE} = 12,9 - 0,02 \times \text{AGE} + 0,55 \times \text{SEXE} - 4,14 \times \text{DREPANOCYTOSE}$$

- Interprétation ?
 - Les hommes ont en moyenne 0,55 g/ dL d' Hb en plus que les femmes
 - Mais le sexe n'est pas significativement associé à l'hémoglobinémie (p-value = 0,30 > 0,05), après ajustement sur l'âge et la présence de drépanocytose

Exercice

Variable	Coefficient	p-value
Intercept	12,9	< 0,0001
Age (en années)	0,02	0,41
Sexe (H/F)	0,55	0,30
Drépanocytose (oui/non)	-4,14	< 0,0001

- Ecriture du modèle ?

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3$$

$$\text{HEMOGLOBINE} = 12,9 - 0,02 \times \text{AGE} + 0,55 \times \text{SEXE} - 4,14 \times \text{DREPANOCYTOSE}$$

- Interprétation ?
 - Les patients présentant une drépanocytose ont en moyenne 4,14 g/ dL de moins d' Hb que les patients n'en présentant pas
 - Et ce de façon statistiquement significative (p value < 0,0001 < 0,05), après ajustement sur l'âge et le sexe

Hypothèses de la régression linéaire

- Indépendance des variables explicatives
 - Linéarité de la relation entre Y et X
 - Normalité des résidus
 - Homoscédasticité des résidus
- } A vérifier à posteriori

Limites

- Conditions d'utilisation souvent peu respectées
- Limitée aux variables dépendantes (Y) quantitatives
 - En recherche médicale, Y est souvent une variable qualitative **binaire**

Exemples :

- Décès / Survie
- Malade ou non
- Réussite versus échec de traitement
- Survenue d'événement indésirables ou pas

RÉGRESSION LOGISTIQUE

Principe

- Y = qualitative **binaire** (ex : M^+ , M^-)
- X = qualitative ou quantitative
 - Ce que l'on cherche à estimer : la **probabilité de survenue de la maladie** quand la valeur des variables X est connue

$$P(M^+ | X_1, X_2, \dots, X_p)$$

- Fréquence de la maladie doit être exprimée sous forme de **risque**
- Risque : probabilité de survenue de la maladie au cours d'une période donnée

Exemple : survenue d'un événement médical avec une date seuil (ex : probabilité d'être malade dans les 5 ans)

Fonction logistique

- Quelle fonction ?

$$P(M^+|X) = f(X)$$

→ Si on utilise la régression linéaire :

Fonction logistique

- Quelle fonction ?

$$P(M^+|X) = f(X)$$

→ Fonction **logistique** :

$$f(X) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta X)}}$$

Odds ratio

- Pourquoi la fonction logistique ?
 - Entre autres, permet de calculer des **odds ratio** (OR)
- Rappel : odds ratio dans une enquête cas-témoin

	M+	M-
Exposé	a	b
Non exposé	c	d

$$OR = \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}$$

Dans une régression
logistique :
 $e^{\beta} = OR$

Interprétation des coefficients

Comme pour une régression linéaire, on présente :

Les valeurs estimées des coefficients β et de l'intercept β_0

Ces coefficients étant des estimations réalisées sur un échantillon, on présente l'écart-type (ou directement leur intervalle de confiance) et/ou une p-valeur

Interprétation des coefficients

- β_0 : valeur du logit de la probabilité de survenue de l'événement étudié lorsque les variables explicatives valent 0
 - Comme pour la régression linéaire, n'a pas toujours de sens (ex : si $X = \hat{\text{âge}}$)
 - Permet de trouver la proportion observée de personnes présentant l'événement étudié pour lesquelles $X = 0$

$$P(M^+ | X = 0) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X}} = \frac{e^{\beta_0}}{1 + e^{\beta_0}}$$

Interprétation des coefficients

Régression simple

Cas n°1

Si X_1 : qualitative binaire

- β_1 : évolution du logit de la probabilité de survenue de l'événement étudié lorsque X passe de 0 à 1
- $\beta > 0$: être exposé augmente la probabilité de survenue de M par rapport au fait de ne pas l'être
 - $\beta < 0$: être exposé diminue la probabilité de survenue de M par rapport au fait de ne pas l'être

Exemple : lien entre le risque de survenue du cancer du poumon (Y) et le fait de fumer (X) avec fumeur ($X=1$) / non-fumeur ($X=0$).

$$\text{Logit } P(Y = 1|X) = \beta_0 + 1,2 \times X$$

«Le logit de la probabilité de la survenue d'un cancer est plus élevé de 1,2 chez un fumeur par rapport à un non fumeur... »

⇒ Pas très intuitif en termes d'interprétation

Interprétation des coefficients

Régression simple

→ On préfère donc souvent présenter l'OR correspondant :

$$OR = e^{\beta}$$

$$OR = e^{1,2} = 3,3$$

⇒ Un fumeur a plus de risque de développer un cancer du poumon qu'un non-fumeur

Rappels - Interprétation d'un OR :

- $OR > 1$: l'exposition est un facteur de risque de la maladie
- $OR = 1$: l'exposition et la maladie ne sont pas associés
- $OR < 1$: l'exposition est un facteur protecteur de la maladie

Interprétation des coefficients

Régression simple

Cas n°2

Si X_1 : qualitative catégorielle à k modalités

- Comme pour la régression linéaire → création de k variables binaires
- Un coefficient par variable ; l'interprétation se fait aussi par rapport à la classe de référence

Exemple : fumeur fréquent / fumeur occasionnel / non-fumeur

	Coefficient estimé
Intercept (α)	-1,33
Fumeur fréquent (X_1)	0,66
Fumeur occasionnel (X_2)	0,24

$$\begin{aligned} \text{Logit } P(M^+|X) &= \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 \\ &= -1,33 + 0,66 \cdot X_1 + 0,24 \cdot X_2 \end{aligned}$$

Fumeur fréquent par rapport à non-fumeur : $OR = e^{\beta_1} = e^{0,66} = 1,9$

Fumeur occasionnel par rapport à non-fumeur : $OR = e^{\beta_2} = e^{0,24} = 1,3$

Interprétation des coefficients

Régression simple

Cas n°3

Ici X_1 : quantitative

→ β_1 = évolution du logit de la probabilité de survenue de l'événement étudié lorsque X augmente d'une unité

- $\beta_1 > 0$: si X_1 augmente, la probabilité de survenue de M augmente
- $\beta_1 < 0$: si X_1 augmente, la probabilité de survenue de M diminue

Exemple : lien entre le risque de survenue d'une maladie (Y) et l'âge (X)

$$\text{Logit } P(Y = 1|X) = \beta_0 + 0,38 \times X$$

$$\text{OR} = e^\beta = e^{0,38} = 1,5 > 1$$

⇒ Si l'âge augmente d'un an, le risque de survenue de la maladie augmente.

Interprétation des coefficients

Régression multiple

→ β : évolution du logit de la probabilité de survenue de l'événement étudié lorsque X augmente d'une unité (= logarithme de l'OR correspondant), toutes choses égales par ailleurs

Exemple : étude de la probabilité de survenue du cancer du poumon en fonction de l'âge (X_1), du tabagisme (X_2)

$$\alpha = -1,44; \beta_1 = 0,52; \beta_2 = 0,98$$

e^{β} = OR de la variable X correspondante ajusté aux autres variables du modèle

- L'interprétation de β_0 n'a pas de sens
- A âge égal, une personne qui fume a un risque de survenue de la maladie plus élevée qu'une personne qui ne fume pas
- Entre deux personnes ayant le même statut tabagique, la plus jeune a un risque de survenue de la maladie moins élevé que celle plus âgée

Test sur les coefficients

- β : différent(s) de 0 ?

→ Là aussi besoin de tester si résultats résultent de fluctuations d'échantillonnage avant de conclure au lien entre la probabilité de survenue P et X

- **Test significatif**

→ OR associé à la variable d'intérêt est statistiquement significatif

- **Test non significatif**

→ On ne peut pas conclure qu'il existe un lien entre la variable d'intérêt et l'événement de santé étudié (OR non significatif)

Exercise

OPEN ACCESS

Dispelling the nice or naughty myth: retrospective observational study of Santa Claus

John J Park,¹ Ben G T Coumbe,² Esther H G Park,³ George Tse,⁴ S V Subramanian,⁵ Jarvis T Chen⁵

Dear Santa,
I was a good boy
this year.
I was helping every-
body. Are your
elves okay?
Are you fine?
Can I talk about
toys? I want a Lego-

Fig 1 | Many children believe that Santa Claus rewards good behaviour. Written by Fred, aged 7

Table 2 | Regional and national patterns of visits by Santa Claus to 186 paediatric hospital wards in the UK, 2015

National/regional areas	No of wards visited	Total No of wards	Percentage visited
England	135	151	89.4
Northern Ireland	8	8	100.0
Scotland	14	15	93.3
Wales	11	12	91.7
English regions:			
East Midlands	8	9	88.9
Eastern England	16	17	94.1
Kent, Surrey, and Sussex	12	13	92.3
North central and east London	12	13	92.3
North east	3	6	50.0
North west	22	23	95.7
North west London	5	7	71.4
South London	10	10	100.0
South west	9	11	81.8
Thames Valley	5	5	100.0
Wessex	8	8	100.0
West Midlands	12	14	85.7
Yorkshire and the Humber	13	15	86.7

Exercice

Table 3 | Logistic regression models: association of school absenteeism, conviction rates, distance from hospital to North Pole, and socioeconomic deprivation with odds of no visits to 186 paediatric hospital wards in the UK by Santa Claus, 2015

Variables	Estimate	SE	z value	P value	Odds ratio (95% CI)
UK:					
School absenteeism (% of total)	0.040	0.661	0.060	0.952	1.04 (0.26 to 3.59)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.051	0.135	-0.384	0.701	0.95 (0.74 to 1.26)
IMD decile	0.207	0.108	1.908	0.056	1.23 (1.00 to 1.54)
England:					
School absenteeism (% of total)	1.053	1.003	1.049	0.294	2.86 (0.35 to 19.04)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.332	0.203	-1.632	0.103	0.72 (0.48 to 1.07)
IMD decile	0.272	0.126	2.163	0.031	1.31 (1.04 to 1.71)
Selected regions and Wales*:					
Conviction rate per 1000 10-17 year olds	0.000	0.034	0.002	0.999	1.00 (0.93 to 1.07)

IMD=index of multiple deprivation.

*Regions excluded were Kent, Surrey, Sussex, Thames Valley, Wessex (crime data measure rates in following areas: East Midlands, eastern England, London, north east, north west, south east, south west, Wales, West Midlands, Yorkshire), Northern Ireland, and Scotland.

Partie redondante avec la dernière colonne (donnent la même information que les OR, mais en moins lisible)

Exercice

En moyenne, les enfants du Royaume-Uni vivant dans des villes avec un taux élevé d'absentéisme scolaire ont plus de risque de ne pas avoir de visite du Père Noël. Mais, après ajustement sur les autres paramètres, le taux d'absentéisme scolaire n'est significativement associé au fait ne pas avoir de visite du Père Noël :

- OR = 1,04 > 1
- p-value = 0,952 > 0,05 ou IC95% contient 1

Table 3 | Logistic regression models: association of school absenteeism, conviction rates, distance from hospital to North Pole, and socioeconomic deprivation with odds of no visits to 186 paediatric hospital wards in the UK by Santa Claus, 2015

Variables	Estimate	SE	z value	P value	Odds ratio (95% CI)
UK:					
School absenteeism (% of total)	0.040	0.661	0.060	0.952	1.04 (0.26 to 3.59)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.051	0.135	-0.384	0.701	0.95 (0.74 to 1.26)
IMD decile	0.207	0.108	1.908	0.056	1.23 (1.00 to 1.54)
England:					
School absenteeism (% of total)	1.053	1.003	1.049	0.294	2.86 (0.35 to 19.04)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.332	0.203	-1.632	0.103	0.72 (0.48 to 1.07)
IMD decile	0.272	0.126	2.163	0.031	1.31 (1.04 to 1.71)
Selected regions and Wales*:					
Conviction rate per 1000 10-17 year olds	0.000	0.034	0.002	0.999	1.00 (0.93 to 1.07)

IMD=index of multiple deprivation.

*Regions excluded were Kent, Surrey, Sussex, Thames Valley, Wessex (crime data measure rates in following areas: East Midlands, eastern England, London, north east, north west, south east, south west, Wales, West Midlands, Yorkshire), Northern Ireland, and Scotland.

Exercice

En moyenne, les enfants du Royaume-Uni vivant dans des villes éloignées du Pôle Nord ont moins de risque de ne pas avoir de visite du Père Noël. Mais, après ajustement sur les autres paramètres, la distance au Pôle Nord n'est significativement associé au fait ne pas avoir de visite du Père Noël :

- OR = 0,95 < 1
- p-value = 0,701 > 0,05 ou IC95% contient 1

Table 3 | Logistic regression models: association of school absenteeism, conviction rates, distance from hospital to North Pole, and socioeconomic deprivation with odds of no visits to 186 paediatric hospital wards in the UK by Santa Claus, 2015

Variables	Estimate	SE	z value	P value	Odds ratio (95% CI)
UK:					
School absenteeism (% of total)	0.040	0.661	0.060	0.952	1.04 (0.26 to 3.59)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.051	0.135	-0.384	0.701	0.95 (0.74 to 1.26)
IMD decile	0.207	0.108	1.908	0.056	1.23 (1.00 to 1.54)
England:					
School absenteeism (% of total)	1.053	1.003	1.049	0.294	2.86 (0.35 to 19.04)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.332	0.203	-1.632	0.103	0.72 (0.48 to 1.07)
IMD decile	0.272	0.126	2.163	0.031	1.31 (1.04 to 1.71)
Selected regions and Wales*:					
Conviction rate per 1000 10-17 year olds	0.000	0.034	0.002	0.999	1.00 (0.93 to 1.07)

IMD=index of multiple deprivation.

*Regions excluded were Kent, Surrey, Sussex, Thames Valley, Wessex (crime data measure rates in following areas: East Midlands, eastern England, London, north east, north west, south east, south west, Wales, West Midlands, Yorkshire), Northern Ireland, and Scotland.

Exercice

En moyenne, plus les enfants d'Angleterre appartiennent à un décile de précarité élevé plus ils ont de risque de ne pas avoir de visite du Père Noël et ce, après ajustement sur les autres paramètres :

- OR = 1,31 > 1
- p-value = 0,031 < 0,05 ou IC95% contient 1

Table 3 | Logistic regression models: association of school absenteeism, conviction rates, distance from hospital to North Pole, and socioeconomic deprivation with odds of no visits to 186 paediatric hospital wards in the UK by Santa Claus, 2015

Variables	Estimate	SE	z value	P value	Odds ratio (95% CI)
UK:					
School absenteeism (% of total)	0.040	0.661	0.060	0.952	1.04 (0.26 to 3.59)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.051	0.135	-0.384	0.701	0.95 (0.74 to 1.26)
IMD decile	0.207	0.108	1.908	0.056	1.23 (1.00 to 1.54)
England:					
School absenteeism (% of total)	1.053	1.003	1.049	0.294	2.86 (0.35 to 19.04)
Distance to North Pole (per 100 km)	-0.332	0.203	-1.632	0.103	0.72 (0.48 to 1.07)
IMD decile	0.272	0.126	2.163	0.031	1.31 (1.04 to 1.71)
Selected regions and Wales*:					
Conviction rate per 1000 10-17 year olds	0.000	0.034	0.002	0.999	1.00 (0.93 to 1.07)

IMD=index of multiple deprivation.

*Regions excluded were Kent, Surrey, Sussex, Thames Valley, Wessex (crime data measure rates in following areas: East Midlands, eastern England, London, north east, north west, south east, south west, Wales, West Midlands, Yorkshire), Northern Ireland, and Scotland.

ANALYSE DE SURVIE

Ce que l'on a déjà vu

Continue

Poids à la
naissance

Régression
linéaire

Binaire

Survenue d'une
maladie

Régression
logistique

Quelle analyse choisissez- vous ?

- Etude de l'association entre le délai de rejet d'une greffe de rein et le sexe des personnes.
- Etude de l'association entre la fonction rénale (mesurée par le taux de créatinine) et le sexe des personnes.
- Etude de l'association entre la présence d'un dysfonctionnement rénal ou non suite à un traitement, et le sexe des personnes.

Régression
linéaire

Régression
logistique

Autre type
d'analyse

Ce que l'on va voir

Continue

Poids à la
naissance

Régression
linéaire

Binaire

Survenue d'une
maladie

Régression
logistique

Survie

Délai jusqu'au
décès

Kaplan Meier
Modèle de Cox

Principe

Objectif : étudier le **délai** de survenue d'un événement (binaire)

L'événement a-t-il eu lieu ?

Quand a-t-il eu lieu ?

Régression logistique

Schéma d'étude

Etude
interventionnelle

Etude de cohorte

Données censurées

Si l'on suit des personnes toute leur vie, il est possible d'estimer le délai moyen de survenue d'un événement dans la population dont elles sont issue.

Données censurées

Données censurées

Données censurées

Ici, contrairement aux exemples précédant, les participants de l'étude n'entrent pas dans la cohorte à la même date calendaire (cohorte fixe), mais au fil de l'eau (cohorte dynamique)

Données censurées

3 cas de figure possibles dans les analyses de survie :

- Personnes ayant eu l'événement au cours du suivi
- Perdus de vue
- Exclu-vivants (personnes n'ayant pas eu l'événement au cours du suivi)

Données « censurées » car on ne connaît pas le délai d'apparition de l'événement chez ces personnes

Analyse des données censurées

- Régression linéaire ?
 - Comment inclure les résultats des exclus vivant (= « au moins x jours ») ?
 - Distribution des délais est souvent asymétrique (invalide l'hypothèse de normalité)
- Ne considérer que les patients ayant l'événement au cours du suivi ?
 - Biais d'estimation
 - Perte d'information
- Données censurées nécessitent une analyse particulière
 - Méthode actuarielle (non abordée ici)
 - Méthode de Kaplan-Meier

La solution utilisée dans les études de survie est d'estimer des pourcentages de survie tout au long du suivi des patients. Afin de prendre en compte les perdus de vue, les patients seront considérés uniquement sur leur durée de participation à l'étude.

Date d'origine

= Date de début de suivi du sujet. A la même définition pour tous les sujets.

Exemples :

- Date d'inclusion dans un essai,
- Date de diagnostic
- Date de la 1ère métastase
- Date de chirurgie

Date de dernières nouvelles

= Date la plus récente où on a observé état du sujet

- Date de l'événement si a eu lieu
- Dernière date où on a observé état du sujet (si l'événement n'a pas eu lieu)

Etat aux dernières nouvelles

= Présence ou absence de l'événement d'intérêt.
A la même définition pour tous les sujets

Date de point et recul

Date de point = date à laquelle on arrête de prendre en compte les événements

- Commune à tous les sujets
- La plus proche possible du moment de l'analyse statistique

Recul : date de point - date d'origine (suivi maximal potentiel de chaque participant de l'étude). Le recul est individuel, spécifique à chaque patient.

= date de dernières nouvelles - date d'origine

Temps de participation

Exercice

Indiquer le temps de participation de chaque individu et si dans l'analyse on considère que l'événement a eu lieu

Date de Point = 01/03/2020

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/03/2019	Vivant	01/08/2020	Vivant		
2	01/01/2020	Vivant	01/10/2020	Décédé		
3	01/04/2019	Perdu de vue (PDV)	01/01/2020	Vivant		
4	01/12/2018	Décédé	01/11/2019	Décédé		

Exercice

Indiquer le temps de participation de chaque individu et si dans l'analyse on considère que l'événement a eu lieu

Date de Point = 01/03/2020

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/03/2019	Vivant	01/08/2020	Vivant	12	Non
2	01/01/2020	Vivant	01/10/2020	Décédé		
3	01/04/2019	Perdu de vue (PDV)	01/01/2020	Vivant		
4	01/12/2018	Décédé	01/11/2019	Décédé		

Exercice

Indiquer le temps de participation de chaque individu et si dans l'analyse on considère que l'événement a eu lieu

Date de Point = 01/03/2020

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/03/2019	Vivant	01/08/2020	Vivant	12	Non
2	01/01/2020	Vivant	01/10/2020	Décédé	2	Non
3	01/04/2019	Perdu de vue (PDV)	01/01/2020	Vivant		
4	01/12/2018	Décédé	01/11/2019	Décédé		

Exercice

Indiquer le temps de participation de chaque individu et si dans l'analyse on considère que l'événement a eu lieu

Date de Point = 01/03/2020

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/03/2019	Vivant	01/08/2020	Vivant	12	Non
2	01/01/2020	Vivant	01/10/2020	Décédé	2	Non
3	01/04/2019	Perdu de vue (PDV)	01/01/2020	Vivant	9	Non
4	01/12/2018	Décédé	01/11/2019	Décédé		

Exercice

Indiquer le temps de participation de chaque individu et si dans l'analyse on considère que l'événement a eu lieu

Date de Point = 01/03/2020

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/03/2019	Vivant	01/08/2020	Vivant	12	Non
2	01/01/2020	Vivant	01/10/2020	Décédé	2	Non
3	01/04/2019	Perdu de vue (PDV)	01/01/2020	Vivant	9	Non
4	01/12/2018	Décédé	01/11/2019	Décédé	11	Oui

Courbe de Kaplan Meier

On cherche à estimer la fonction de survie.

$$S(t) = P(T \geq t)$$

En l'absence de censure :

$$S(t) = \frac{\text{nb de personnes encore en vie après } t}{\text{nb de personnes à risque au début de l'étude}}$$

→ La probabilité d'être indemne de l'événement considéré 2 mois après t_0 est de 40%

Courbe de Kaplan Meier

On cherche à estimer la fonction de survie.

$$S(t) = P(T \geq t)$$

En l'absence de censure :

$$S(t) = \frac{\text{nb de personnes encore en vie après } t}{\text{nb de personnes à risque au début de l'étude}}$$

En présence de censure :

- Nombre de personnes à risque diminue au cours du temps
- Nombre de personnes encore en vie n'est pas connu
- Il faut procéder par période de temps pour estimer $S(t)$

Estimation

Méthode de Kaplan-Meier

Démarche :

1. Classer les sujets par temps de participation individuelle t_i croissant
 2. A chaque instants où un événement est observé
 - Identifier les sujets à risque
 - Compter les événements pour l'intervalle de temps considéré
 - Estimer $S(t)$
- *La fonction de survie $S(t)$ est réévaluée à chaque événement*
- *$S(t)$ est considérée comme constante entre deux événements*

Estimation

Méthode de Kaplan-Meier

★ Événement

■ Suivi

Exemple : 7 sujets dans une étude thérapeutique

→ Date de Point (DP) = 01/06/1978

Estimation

Méthode de Kaplan-Meier

Exemple : 7 sujets dans une étude thérapeutique

→ Date de Point (DP) = 01/06/1978

n° sujet	Date Origine (DO)	Etat à Date de Point (DP)	Date Dernières Nouvelles (DDN)	Etat aux dernières nouvelles	Temps de participation t_i (mois)	Evénement
1	01/01/1977	Décédé	01/10/1977	Décédé	9	Oui
2	01/07/1977	Vivant	01/07/1978	Décédé	15	Non
3	01/05/1977	Perdu de vue (PDV)	01/02/1978	Vivant	9	Non
4	01/05/1977	Décédé	01/08/1977	Décédé	3	Oui
5	01/06/1977	Perdu de vue (PDV)	01/05/1978	Vivant	11	Non
6	01/07/1977	Décédé	01/01/1978	Vivant	6	Oui
7	01/08/1977	Perdu de vue (PDV)	01/03/1978	Vivant	7	Non

Estimation

Méthode de Kaplan-Meier

Etape 1 : Classer les sujets par temps de participation individuelle t_i croissant

Temps observés : 3, 6, 7*, 9, 9*, 11*, 15*

→ $S(t)$ n'est estimée qu'aux temps avec événement : 3, 6, et 9

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1

t_i : temps de participation du $i^{\text{ème}}$ événement (durée de survie)

n_i : nombre de personnes exposées au risque au temps t_i

m_i : nombre d'événements constatés au temps t_i

c_i : nombre de données censurées entre $[t_{i-1} ; t_i[$

q_i : probabilité de survie à chaque instant t_i

$S(t_i)$: probabilité cumulée de survie en t_i

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1
3	$n_{t=3} = n_{t=0} - c_{[0;3[}$ $= 7$	1	0	$n_{t=3} - m_{t=3} / n_{t=3} = 6/7$	$q_{t=0} \times q_{t=3} = 6/7 = 0,857$

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1
3	$n_{t=3} = n_{t=0} - c_{[0;3[}$ $= 7$	1	0	$n_{t=3} - m_{t=3} / n_{t=3} = 6/7$	$q_{t=3} = 0,857$
6	$n_{t=6} = n_{t=3} - m_{t=3} - c_{[3;6[}$ $= 7 - 1 - 0$ $= 6$	1	0	$n_{t=6} - m_{t=6} / n_{t=6} = 5/6$	$q_{t=3} \times q_{t=6} = 6/7 \times 5/6$ $= 5/7$ $= 0,714$

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1
3	$n_{t=3} = n_{t=0} - c_{[0;3[}$ $= 7$	1	0	$n_{t=3} - m_{t=3} / n_{t=3} = 6/7$	$q_{t=3} = 0,857$
6	$n_{t=6} = n_{t=3} - m_{t=3} - c_{[3;6[}$ $= 7 - 1 - 0$ $= 6$	1	0	$n_{t=6} - m_{t=6} / n_{t=6} = 5/6$	$q_{t=3} \times q_{t=6} = 6/7 \times 5/6$ $= 5/7$ $= 0,714$

On considère que l'événement a eu lieu avant la censure → l'exclu-vivant est compté comme exposé

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1
3	$n_{t=3} = n_{t=0} - c_{[0;3[}$ $= 7$	1	0	$n_{t=3} - m_{t=3} / n_{t=3} = 6/7$	$q_{t=3} = 0,857$
6	$n_{t=6} = n_{t=3} - m_{t=3} - c_{[3;6[}$ $= 7 - 1 - 0$ $= 6$	1	0	$n_{t=6} - m_{t=6} / n_{t=6} = 5/6$	$q_{t=3} \times q_{t=6} = 6/7 \times 5/6$ $= 5/7$ $= 0,714$
7	$n_{t=7} = n_{t=6} - m_{t=6} - c_{[6;7[}$ $= 6 - 1 - 0$ $= 5$	0	1	$n_{t=7} - m_{t=7} / n_{t=7} = 1$

Calcul réalisé à titre d'illustration, mais non nécessaire : la fonction de survie n'est ré-estimée qu'aux temps avec événement

t_i (mois)	n_i	m_i	c_i	q_i	$S(t_i)$
0	7	0	0	1	1
3	$n_{t=3} = n_{t=0} - c_{[0;3[}$ $= 7$	1	0	$n_{t=3} - m_{t=3} / n_{t=3} = 6/7$	$q_{t=3} = 0,857$
6	$n_{t=6} = n_{t=3} - m_{t=3} - c_{[3;6[}$ $= 7 - 1 - 0$ $= 6$	1	0	$n_{t=6} - m_{t=6} / n_{t=6} = 5/6$	$q_{t=3} \times q_{t=6} = 6/7 \times 5/6$ $= 5/7$ $= 0,714$
9	$n_{t=9} = n_{t=6} - m_{t=9} - c_{[6;9[}$ $= 6 - 1 - 1$ $= 4$	1	0	$n_{t=9} - m_{t=9} / n_{t=9} = 3/4$	$q_{t=7} \times q_{t=9} = 5/7 \times 3/4$ $= 15/28$ $= 0,536$

Courbe de Kaplan Meier

→ Evénement

→ Censure

Ordonnée :
taux de
survie
cumulatif

Courbe n'est pas
définie au-delà de
la dernière censure

Abscisse :
temps

Médiane de survie

Nombre de sujets à risque

Nombre de sujets à risque au cours du temps pour chaque courbe de survie présentée

Interprétation

B Event-free survival according to high probability of occupational exposure to pesticides

No. of patients

High probability of exposure	48	31	15	5	0
No high probability of exposure	196	154	88	31	2

Interprétation

B Event-free survival according to high probability of occupational exposure to pesticides

No. of patients
 High probability of exposure
 No high probability of exposure

High probability of exposure	48	31	15	5	0
No high probability of exposure	196	154	88	31	2

D Overall survival according to high probability of occupational exposure to pesticides

No. of patients
 High probability of exposure
 No high probability of exposure

High probability of exposure	48	39	21	5	0
No high probability of exposure	196	175	102	39	3

Traitement des censures

- Il faut vérifier que la **censure** est bien **non informative**
 - Mécanisme de censure ne doit pas être lié à la survenue de l'événement
 - Exemple : étude de la survie des patients transplantés rénaux (événement = décès du patient). Les patients retournant en dialyse (→ censurés) sont plus à risque de décès
 - Solution : considérer le patient/greffon (dialyse = événement)
- **Exclus-vivants** : censure liée à la Date de Point (DP)
 - Donc forcément indépendante de la survenue de l'événement
- **Perdus de vue** : plusieurs aspects à vérifier !
 - Si peu nombreux (<10-15%) : assimilables aux Exclus-vivants
 - Si nombreux et comparables au reste de l'échantillon : assimilation aux Exclus-vivants
 - Si nombreux et non comparables au reste de l'échantillon : analyses de sensibilité

Exercice

Survie de patients avec un cancer du poumon en fonction de leur sexe (1 = homme, 2 = femme)

Quelle est la médiane de survie pour chaque groupe ?

Comparaison de courbes de survie

Test du logrank

H_0 : les deux courbes de survie sont identiques (survie du groupe A = survie du groupe B)

H_1 : les deux courbes de survie sont différentes

Conditions d'application (hypothèses) du test du logrank

- Effectifs attendus > 5
- Censure non informative
- Risque dans un groupe est toujours supérieur à celui dans l'autre
- Les courbes ne se croisent pas

Ce que l'on va voir

Continue

Poids à la
naissance

Régression
linéaire

Binaire

Survenue d'une
maladie

Régression
logistique

Survie

Délai jusqu'au
décès

Kaplan Meier
Modèle de Cox

Modèle de Cox

Exprime le **risque instantané de survenue de l'événement** en fonction (d'un ou) de plusieurs facteurs explicatifs

→ **Hazard ratio (HR)** : risque relatif instantané d'événement

Univarié
(~test du logrank]

Multivarié

Exemple : Etude du risque de présenter un infarctus du myocarde au cours du suivi
(exemple fictif)

Modèle de Cox

Variable	HR [IC 95%]	p-valeur
Sexe (F/H)	0,37 [0,25; 0,54]	0,004
Age (+10 ans)	1,22 [1,11; 1,35]	0,003
HTA : non	1	
HTA traitée	1,49 [1,22; 1,82]	0,004
HTA non traitée	2,23 [1,82; 2,72]	<0,001

Sexe : en moyenne, après ajustement sur les autres paramètres, le sexe féminin est associé à un risque significativement moins élevé de présenter un infarctus, avec un HR à 0,37 comparé au sexe masculin.

Modèle de Cox

Variable	HR [IC 95%]	p-valeur
Sexe (F/H)	0,37 [0,25; 0,54]	0,004
Age (+10 ans)	1,22 [1,11; 1,35]	0,003
HTA : non	1	
HTA traitée	1,49 [1,22; 1,82]	0,004
HTA non traitée	2,23 [1,82; 2,72]	<0,001

Age : en moyenne, après ajustement sur les autres paramètres, un âge plus avancé est associé à un risque significativement plus élevé de présenter un infarctus, avec un HR à 1,22 pour 10 ans.

Remarques

Hypothèse des risques proportionnels

- Ratio constant au cours du temps
- HR : rapport de risque instantané mais supposé constant dans le temps

Risque « au cours du suivi »

- Si l'on compare le risque de décès dans deux groupes, la probabilité de décès sera égale à 1 si l'on attend suffisamment longtemps

Biais de temps immortel

- Il faut que tous les participants soient à risque tout au long du suivi

Ne concerne pas que le décès

Remarques

Le « day at risk = 0 » correspond au jour de l'intervention chirurgicale. La courbe en trait plein représente le groupe avec douche préventive, la courbe en pointillés au groupe contrôle. L'événement recherché est la survenue d'infections nosocomiales.

- Les analyses de survie ne concernent pas que les décès, tout événement pour lequel il est intéressant de considérer un délai d'apparition peut être étudié via ce type d'analyse
- Les courbes de Kaplan-Meier peuvent être croissantes, dans ce cas, elles permettent alors d'estimer la probabilité de présenter l'événement considéré après un certain temps (ici la probabilité de présenter une infection nosocomiale dans les 4 jours après l'intervention dans le groupe avec douche préventive est de 12%).

Exercice

Comment étudier la probabilité qu'un chocolat mis à disposition dans un service clinique soit mangé en fonction de sa marque ?

Exercice

Interpréter les résultats de cette étude :
Gajendragadkar et al., The survival time of chocolates on hospital wards: covert observational study, *BMJ*, 2013

→ Numéro spécial de Noël du BMJ qui porte sur des études loufoques

→ Ici : comparaison de la durée de disparition des chocolats selon la marque, une fois les boîtes déposées dans les salles d'hôpital.

Résultat : préférence pour les Quality Streets par rapport aux Roses avec un HR de 0,70 statistiquement différent de 1.

No at risk		0	60	120	180	240	300	360
Quality Street	135	90	67	50	28	4	3	
Roses	123	68	47	24	16	6	1	

Hazard ratio for survival of Roses v Quality Street 0.70, [95% CI : 0.53 - 0.93], p=0.014,

Fig 1 Kaplan-Meier survival curves for Quality Street and Roses chocolates across all wards

Fig 2 Bar chart showing number and type of chocolate consumed by role of staff